


























## Clé simplifiée des ordres d'insectes les plus susceptibles d'être vus au jardin

Ordres et exemples de représentants

<b>Zygentomères</b> ( <i>Thysanoures</i> ) Poissons d'argents			Pas d'ailes. Antennes longues. Deux ou trois longs appendices au bout de l'addomen.
<b>Éphéméroptères</b> Éphémères ("mannes")			Ailes postérieures + petites, arrondies. Ailes dressées au repos. Longs appendices au bout de l'abdomen.
<b>Odonates</b> Libellules et demoiselles			Antennes courtes. Gros yeux. Deux paires d'ailes de taille similaire, ouvertes (libellules) ou fermées (demoiselles) au repos.
<b>Plécoptères</b> Perles			Ailes longues, étroites, sur celles du bas plus courtes et lobées. Souvent deux appendices à l'abdomen.
<b>Dermaptères</b> Perce-oreilles			Ailes très réduites sous des ailes antérieures courtes et cornées. Deux appendices en forme de pinces.
<b>Orthoptères</b> Sauterelles, criquets, grillons, blattes, mantes religieuses, etc			Ailes sup. longues et opaques. Pattes arrières fortes. Appendices abdominaux courts. Antennes courtes (criquets) ou longues (grillons, sauterelles). Broyeur.
<b>Mécoptères</b> Mouches-scorpion			Ailes généralement tachetées. Tête prolongée en un long 'bec'. Abdomen du mâle en 'queue de scorpion'.
<b>Thysanoptères</b> Thrips			Souvent difficiles à voir car très petits (- de 5 mm). Ailes frangées de soies.
<b>Neuroptères</b> Chrysopes, corydales, etc			Deux paires d'ailes assez semblables. Antennes longues et minces. Sans appendice abdominal.
<b>Hémiptères</b> sous-ordre <b>Hétéroptères</b> Punaises			Ailes antérieures collées sur le corps, cornées à la base et semi-transparentes à la pointe. Parfois absentes ou discrètes. Piqueur-suceur.
<b>Hémiptères</b> sous-ordre <b>Homoptères</b> Cigales, pucerons, cochenilles aleurodes, cercopes, etc			Ailes antérieures parfois translucides (cigale, puceron), souvent colorées, + ou- opaques. Piqueur-suceur.
<b>Lépidoptères</b> Papillons, sésies			Ailes recouvertes de petites écailles. Pièces bucales (si présentes) en forme de trompe enroulée.
<b>Diptères</b> Moustiques, mouches, tipules...			Une seule paire d'aile. La deuxième paire réduite à de petits balanciers. Gros yeux chez les mouches.
<b>Coléoptères</b> Scarabées, coccinelles, cassides, longicornes, charançons, etc			Ailes antérieures (parfois écourtées) cornées et opaques, cachant les ailes membraneuses dessous. Pièces bucales de type broyeur.
<b>Hyménoptères</b> Abeilles, guêpes, fourmis, tenthrèdes, tremex			Souvent une taille très fine. Deux paires d'ailes (si présentes), celles du haut plus grandes.
<b>Trichoptères</b> Phryganes (caddisflies)			Ressemble aux papillons de nuit, sauf pour les ailes poilues et les très longues antennes. Étui larvaire.